SOLU.FR
Deux univers

Actifs d'origine naturelle
Prévenir les maladies
Traiter · Soigner
Fertiliser - Stimuler

Éloigner ou éliminer
les insectes et les rongeurs
Des solutions parmi les plus sûres
et les plus efficaces

SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste, protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay

Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

SOLU'TRAP

Mineuse du Marronnier
Bande de glu

BANDE DE GLU
pour capturer les papillons femelles

10 mètres
Largeur 16 cm

Capture les papillons femelles de la mineuse du marronnier

Mise en place simple et rapide

Solution écologique, sans insecticide

La **mineuse du marronnier**, également connue sous son nom scientifique **Cameraria ohridella**, est un petit papillon dont les larves s'attaquent principalement aux feuilles des marronniers. Les larves creusent des galeries dans les feuilles, ce qui provoque leur dessèchement et leur chute prématurée.

Pour lutter contre la propagation de la mineuse du marronnier, une méthode écologique et efficace est l'utilisation de capsules de phéromone. Ces capsules imitent les phéromones sexuelles émises par les femelles du papillon, attirant ainsi les mâles dans un piège. Cette méthode de lutte biologique permet de réduire la population de mineuses sans recourir à des pesticides chimiques, qui peuvent être nocifs pour l'environnement et d'autres organismes.

Comment utiliser la bande de glu SOLU'TRAP contre les papillons de la mineuse du marronnier ?

Identifier le problème

Dommages aux feuilles : Les premiers signes d'une attaque par la mineuse du marronnier sont souvent des galeries sinueuses visibles à la surface des feuilles, résultant du chemin creusé par les larves à l'intérieur du feuillage. Ces dommages peuvent conduire à un jaunissement prématuré et à la chute des feuilles.
Présence de larves : Les larves de la mineuse du marronnier sont petites, de couleur jaune pâle à brunâtre, avec une tête noire. Elles se développent à l'intérieur des feuilles, ce qui rend leur observation directe difficile sans disséquer le feuillage infesté.
Déjections : Les larves expulsent des excréments de couleur claire, qui peuvent s'accumuler sur les feuilles inférieures et autour de l'arbre, indiquant une présence active de l'infestation.
Présence de papillons : Les adultes sont de petits papillons dont les ailes présentent des motifs distinctifs de couleur brun doré à cuivré. Ils sont plus souvent observés près des arbres hôtes pendant les périodes de vol.

Comment la bande de glu SOLU'TRAP agit-elle?

Les papillons femelles volent difficilement et se contentent de voleter en rond, comme enivrées. Elles gravissent le tronc de l'arbre en progressant par petits bonds et sautillements.
La solution pour les combattre dans leur ascension consiste à apposer deux bandes de glu adhésives sur le tronc. Les femelles seront rendues inoffensives en se collant sur cette bande de glu.

Ce remède a un effet secondaire très appréciable, à savoir que les femelles capturées sur la bande adhésive continuent à libérer de la phéromone qui attire complémentairement des mâles.

Cycle biologique de la Mineuse du marronnier



1 **Nidification des papillons pour passer l'hiver dans les débris végétaux.**

2 **Sortie d'hivernation des papillons dès que les températures nocturnes dépassent les 9,5°C.**
Les températures atteignent 10-12°C
Piégeage des papillons
Période de vol et de reproduction.

3 **Ponte et éclosion des oeufs.**
Les chenilles dévorrent le feuillage.
Transformation en papillon.

Conseils du PRO

Éviter la présence d'herbes hautes, qui créerait des passages aux insectes pour rejoindre les parties supérieures de l'arbre sans passer par le tronc.
Les tâches éventuelles de glu se nettoient au white spirit ou diluant F.

Période de piègeage de la mineuse du marronnier

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Mode d'emploi de la bande de glu pour capturer la mineuse du marronnier

Format extra large de 16 cm de hauteur et de 10 m de longueur.



Mesurer la circonférence du tronc à protéger



Découper cette valeur en y ajoutant environ 5 à 10 cm de bande pour la superposition

Enlever le film protecteur

Ceinturer le tronc, glu vers l'extérieur, superposer les deux extrémités

Fixer sur 2 niveaux la bande au tronc à l'aide du cordon élastique



Poser une autre bande à une distance d'environ 20 – 30 cm de la première

Vérifier qu'il n'y ait pas de passage possible entre la bande et l'écorce. Vérifier une fois par semaine, que la glu ne soit pas saturée par les insectes ou bien par la poussière de l'air !
DURÉE D'EFFICACITÉ : 3 à 4 semaines

	Dimensions	Efficacité	Période d'application	Mode d'application
Bande de glu Mineuse du marronnier	Longeur : 10m Hauteur : 16cm	3-4 semaines ou jusqu'à saturation	Dès la fin de la floraison du marronnier.	2 bandes engluées sont recommandées (20 – 30 cm) sur le tronc à 2 mètres du sol.